

LA PUISSANCE DU TALON® MAINTENANT DISPONIBLE EN BLOCS DE 20 GRAMMES COMPRESSÉS À FROID ET TITRANT 25 PPM DE BRODIFACOUM.

- ▶ Permet d'éliminer les rats et les souris à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
- ▶ Appât rodenticide à prise unique.
- ▶ Permet de lutter contre les rongeurs résistants aux anticoagulants.
- ▶ Permet l'éradication des colonies avec un minimum d'appât.

Une formulation innovante et hautement attractive

- ▶ **Formulation équilibrée** (paraffine, farine et brisures de grains).
- ▶ **Riche en arômes et excipients.**
- ▶ **Très attractive et appétante, même en compétition alimentaire.**
- ▶ **Stable à l'humidité et à la chaleur.**
- ▶ **Ultra polyvalente.**
- ▶ **Conditionné en seau de 5 kg (250 blocs de 20 g).**

FOR LIFE UNINTERRUPTED™

Et la vie continue™



 **Talon® Block XT**

 **syngenta.**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Doses et distances minimales entre les postes d'appâtage

Pour le contrôle du rat brun (*Rattus norvegicus*), du rat noir (*Rattus rattus*) et de la souris domestique (*Mus musculus*). Les appâts doivent être placés uniquement dans des boîtes d'appâtage sécurisées.

- ▶ Pour les rats : 100 - 200 g d'appât par point d'appât. Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 mètres.
- ▶ Pour la souris : 20 - 40 g d'appât par point d'appât. Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 mètres.

En intérieur :

Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

En extérieur :

Les postes d'appâtage doivent être inspectés [pour les souris - au minimum tous les 2 à 3 jours au] [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après le] début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage au besoin. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Ne pas utiliser en guise d'appâtage permanent.

TALON® BLOCKXT (TP14 Rodenticide) - Attention - H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



Syngenta France SAS - 1228, Chemin de l'Hobit - 31790 Saint-Sauveur France.

SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. N° d'agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

TALON® BLOCKXT (TP14 Rodenticide) - AMM N° FR-2019-0007 - Composition : 0.025 g/kg brodifacoum - P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur.

© Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta-pro.fr.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**