

UTILISATION :

VAZOR® PHEPRA est destiné à la lutte contre les insectes nuisibles rampants et volants en pulvérisation et brumisation à l'intérieur, par exemple dans les maisons, les entrepôts, les abris pour animaux, les installations industrielles, les bâtiments et espaces publics, y compris les zones de manipulation et de stockage des aliments, ainsi que les hôpitaux, et à proximité immédiate des bâtiments. Il peut être utilisé dans les locaux agricoles, les écuries, les élevages de poulets et de volailles, les élevages de bétail, les entrepôts de grains vides, les dépendances des fermes et les laiteries. Ainsi qu'en pulvérisation de surface dans les écuries occupées. VAZOR® PHEPRA est efficace contre un large éventail d'insectes nuisibles commerciaux et résidentiels.

Type de formulation :

ZW (Mélange de suspension de capsule et d'émulsion concentrée)

Instructions d'emploi:

VAZOR PHEPRA détruit en quelques heures et dispose d'une activité résiduelle prolongée allant jusqu'à 12 semaines. L'activité résiduelle dépend de la surface sur laquelle le produit est appliqué et des conditions environnementales. Répétez l'application si nécessaire. Envisager les principes de la lutte intégrée contre les nuisibles (IPM) pour éviter la résistance.

Précautions:

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux lors du stockage

USAGE PRO :

- fourmis (*Lasius niger*)
- punaises de lit (*Cimex lectularius*)
- blattes allemandes et orientales (*Blattella germanica* et *Blatta orientalis*)
- coléoptères de la litière (*Alphitobius diaperinus*)
- acariens rouges de la volaille (*Dermanyssus gallinae*)
- mouches : mouche domestique (*Musca domestica*), mouche des étables (*Stomoxys calcitrans*), mouche des cornes (*Haematobia irritans*)
- moustiques (*Aedes aegypti* et *Culex pipiens*)
- mites alimentaires (*Ephestia kuehniella* et *Plodia interpunctella*)
- guêpes (*Vespula Germanica*)
- frelons européens (*Vespa crabro*)

Composition :

1R-TRANS-PHÉNOTHRINE 10 % P/P (100 G/L)
PRALLÉTHRINE 1 % P/P (10 G/L)

Durée de conservation :

2 ans à partir de la date de fabrication sur le flacon

Dosage :

Dosage général pour la pulvérisation :
50 ml pour 5l d'eau pour 100m² (50 ml/m²)
La teneur en eau nécessaire peut varier en fonction de l'état de la surface et du matériel d'application.



Conditionnement :
Flacon de 1L

Produit biocide :
TP18



Vous savez quand vous
êtes en de bonnes mains

www.killgerm.com



Instructions de mélange :

Bien agiter le récipient du produit avant son utilisation. Remplir à moitié le réservoir propre de l'équipement de pulvérisation avec la quantité d'eau nécessaire. Ajouter le bon volume de VAZOR PHEPRA. Remplir le réservoir de l'équipement de pulvérisation avec le volume manquant d'eau claire. Fermer le réservoir de l'équipement de pulvérisation et agiter. Si un délai s'écoule entre deux traitements, agiter à nouveau avant de réutiliser le produit.

Ne pas stocker la solution de pulvérisation préparée et utiliser la solution de pulvérisation mélangée prête à l'emploi dès que possible. Nettoyer l'équipement de pulvérisation à l'eau claire après le traitement.

Ne pas mélanger VAZOR PHEPRA avec d'autres produits (biocides ou désinfectants)

Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur manuel, mécanique ou électrique approprié produisant un jet à grosses gouttelettes. Pulvériser uniformément sur toutes les surfaces en tenant la buse du pulvérisateur à environ 30 cm de la surface, en mouillant bien juste avant le point de ruissellement. Accorder une attention particulière aux fissures, aux crevasses, aux espaces morts et aux endroits où s'installent les insectes. Le produit ne doit pas être utilisé sur les vêtements ou le linge de lit (draps couvertures, couettes) ni dans les lits où dorment les nourrissons.

Zones intérieures (insectes volants et rampants) :

Dans les locaux à usage domestique ainsi que dans les zones occupées en permanence, telles que les services hospitaliers, les foyers résidentiels/maisons de repos et de soins, les prisons et les zones où les humains et les animaux domestiques peuvent entrer en contact avec le produit pulvérisé, appliquer le produit uniquement pour traiter de manière locale/ponctuelle ou les fissures et crevasses. Fermer toutes les portes et fenêtres avant de l'utiliser. Ne pas entrer pas dans la zone traitée pendant au moins 30 minutes après le traitement et après le séchage du produit. Bien aérer la zone traitée.

Nids de guêpes et de frelons :

Appliquer généreusement et directement sur le nid ou sur les trous d'entrée des nids cachés jusqu'à saturation du nid. Appliquez au crépuscule avec un équipement de pulvérisation et un équipement de protection appropriés.

Fourmis (nid de fourmis) :

Traiter une surface de 1 m² autour de l'entrée du nid et une bande de 10 cm sur les chemins des fourmis.

Punaises de lit :

Appliquer dans les endroits préférés des insectes sous et sur les coins du matelas, sur la base et sous le lit, sous les tables de nuit, dans les fissures et les crevasses autour du lit.

Locaux agricoles, écuries, hangars, porcheries, élevages de bovins, de chevaux, de poulets et de volailles, élevages de bétail, dépendances de la ferme et laiteries :

Ne pas appliquer directement sur les animaux. Enlever les oeufs avant de pulvériser. Nettoyer les surfaces avant l'application et traiter sur surfaces sèches. Appliquer le produit sous forme de brouillard fin avec une pression moyenne ; traiter soigneusement les surfaces mais pas jusqu'au ruissellement. Faites particulièrement attention aux fissures, aux crevasses et aux endroits où les insectes s'installent.

Traitements de barrière et périphériques :

Créer une bande continue de 20 à 30 cm sans à-coup pour former une barrière efficace le long du périmètre. Pulvériser autour des portes, des fenêtres et des ouvertures, en prêtant une attention particulière aux voies de migration et aux zones où les insectes se cachent et s'installent habituellement. Ne pas laisser le produit se lessiver dans l'environnement ou dans les égouts. Ne pas pulvériser jusqu'au ruissellement, ne pas appliquer dans ou autour des égouts, ne pas contaminer les plans d'eau ou les cours d'eau. Ne pas appliquer le produit en cas de vent fort ou de pluie battante.



INTÉRIEUR - TRAITEMENT SPATIAL - NÉBULISATION À FROID ET CHAUD :**Dosage: 50 ml (à diluer dans 1 à 5 l d'eau) pour 500 m³.**

La teneur en eau nécessaire peut varier en fonction du matériel d'application.

L'application se fait au moyen d'équipements de brumisation thermique, d'équipements à ultra bas volume (ULV) générant un aérosol froid, de pulvérisateurs rotatifs assistés par ventilateur et de pulvérisateurs à

main ou à dos conçus pour la pulvérisation aérienne. Pulvériser dans l'air autour des zones à traiter en accordant une attention particulière aux endroits où les insectes se reposent et se reproduisent ou leurs zones de prédilection. Fermer les fenêtres et les portes avant d'appliquer le produit et les garder fermées pendant au moins une heure. Couper l'électricité et l'air conditionné. Tenir à l'écart tous les animaux et toutes les personnes pendant l'application. Adapter l'application au moment où l'insecte cible est le plus actif. Après l'application, aérer la zone traitée pendant au moins 4 heures ou utiliser un ventilateur

(taux de 1200 m³/h) pour ventiler les pièces. Avant de pénétrer dans la zone traitée, s'assurer que le brouillard ait complètement séché. Portez des gants, ne respirez pas les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Sinon, portez une protection faciale complète avec un masque respiratoire auto-ventilé et une protection oculaire. Une protection respiratoire est recommandée lors de la rentrée après la brumisation**Premiers secours:** En cas de douleurs persistantes appeler un médecin. Enlever les vêtements contaminés.**Inhalation:** éloigner de la zone de danger les personnes contaminés par le produit. Assurer un apport d'air frais**Contact cutané:** laver immédiatement avec de l'eau et du savon**Contact oculaire:** Enlever les lentilles de contact. Rincer soigneusement à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes, les paupières bien écartées et en protégeant l'oeil non affecté**Ingestion:** Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement le médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente

En cas de détresse aigue contacter le 15 ou un centre antipoison (ORFILA/INRS 0145425959)

Nettoyage du matériel et élimination du produit: Après traitement, rincer le matériel avec de l'eau et traiter ce résidu comme un déchet industriel dangereux, ainsi que l'emballage vide et les restes éventuels. Ne pas réutiliser l'emballage.

Ne jeter aucun résidu dans les égouts ou cours d'eauDangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et/ou sur demande : info@killgerm.fr